

oscillococinum®

golyócskák egyadagos tartályban (Oscillococinum golyócskák)
Homeopátiás gyógyszer

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

- Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont

- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Oscillococinum golyócskák és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Oscillococinum golyócskák szedése előtt
3. Hogyan kell szedni az Oscillococinum golyócskákat?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Oscillococinum golyócskákat tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ OSCILLOCOCCINUM GÖLYÓCSKÁK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az Oscillococinum golyócskák homeopátiás gyógyszer, mely a homeopátiás gyakorlatban az influenzás tünetek (hidegrázás, általános fájdalom, láz, orrfolyás, köhögés) enyhítésére alkalmazható.

Állati eredetű anyagok felhasználásával készült golyócskák.

2. TUDNIVALÓK AZ OSCILLOCOCCINUM GÖLYÓCSKÁK SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje az Oscillococinum golyócskákat

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödnek.

Ezek átmenetiek és veszélytelenek. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, vagy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

Tejcukor (laktóz) érzékenyek vegyék figyelembe, hogy a készítmény egy adagja 0,15 g tejcukrot tartalmaz!

Cukorbetegség esetén figyelembe kell venni, hogy a készítmény egy adagja 0,85 g szacharózt tartalmaz.

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama

alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. cukorka, stb.) fogyasztani, és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását. Nem a javallat szerinti, ill. a gyógyszer hosszantartó szedése esetén, vagy a betegájékoztatóban feltüntetett adagok túllépése esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszerizválati tünetek*) léphetnek fel, amelyek új, eddig nem tapasztalt panaszok formájában jelentkezhetnek.

Amennyiben a tünetek nem javulnának, esetleg rosszabbodnának, vagy új tünetek jelennek meg, orvossal történő konzultáció szükséges.

Egyéb gyógyszerek és az Oscillococinum golyócskák

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Az Oscillococinum golyócskák egyidejű bevétele étellel és itallal

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. étel, ital, stb.) fogyasztani.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Terhesség és szoptatás időszaka alatt biztonságosan szedhető.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Oscillococinum golyócskák nem befolyásolják

a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ OSCILLOCOCCINUM GÖLYÓCSKÁKAT?

Az Oscillococcinum gölyócskákát mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A legkedvezőbb hatás elérésének érdekében a homeopátiás gyógyszerkészítmény alkalmazását az influenza kezdeti tüneteinek jelentkezésekor meg kell kezdeni.

A készítmény ajánlott adagja:

- Influenzás időszakban: hetente egyszer 1 adag, azaz egy műanyag tartály tartalma.
- Az influenzás tünetek jelentkezésekor: 1 adagot bevenni, majd ezt 2-szer, esetleg 3-szor (6 óránként) megismételni.
- A már kialakult influenza esetén: naponta 2-szer (reggel és este) 1 adag 1-3 napon át.

Az adagot étkezés előtt negyedórával vagy étkezés után 1 órával a nyelv alá helyezve kell bevenni. A nyelv alá helyezett gölyócskák a bevételt követően hamarosan feloldódnak. A készítményt gyermekek és csecsemők is szedhetik.

Csecsemőknek a féltrevelés veszélye miatt – kevés, előzőleg kiforralt, majd lehűtött – vízben feloldva kell adagolni.

Amennyiben a tünetek 3 napon túl is változatlanul fennállnak, javulás nem következik be, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több Oscillococcinum gölyócskákát vett be

Kérjen tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől.

Ha elfelejtette bevenni az Oscillococcinum gölyócskákát

Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot, pótolja azt mielőbb. Ha az elfelejtett adag pótlása és a következő előírás szerinti adag bevétele nagyjából azonos időpontra esik, folytassa a gyógyszer szedését az eredetileg előírt módon.

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így az Oscillococcinum gölyócskák is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Az Oscillococcinum gölyócskák alkalmazásával kapcsolatban eddig mellékhatást nem jelentettek.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Postafiók 450 H-1372 Budapest

www.ogyei.gov.hu

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL AZ OSCILLOCOCCINUM GÖLYÓCSKÁKÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! Legfeljebb 25°C-on, fénytől, közvetlen napugárázástól és erős elektromágneses hatásoktól védve, az eredeti csomagolásban tárolandó.

A dobozon és a tartályon feltüntetett lejárati idő után ne szedje az Oscillococcinum gölyócskákát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne szedje az Oscillococcinum gölyócskákát, ha azon a bomlás jelei láthatók.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a fel nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Oscillococcinum gölyócskák egyadagos tartályban

- Készítmény hatóanyagai: 0,01 ml Anas barbariae hepatis et cordis kivonat (extractum) 200 K / 1 g

- Egyéb összetevők: szacharóz (0,85g), laktózmohohidrát (0,15 g).

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Fehér színű, kisméretű, homogén, szagtalan, édes ízű gölyócskák pattintós LDPE kupakkal lezárt, fehér színű PP tartályba töltve.

1 x 3 adag, 2 x 3 adag, 10 x 3 adag (tartály) átlátszó PVC/papír buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártók

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Gyártó: **BOIRON** - 20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - France

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - France

Nyilvántartás számai: OGYI-HG-026/02 3 adag

OGYI-HG-026/03 6 adag OGYI-HG-026/04 30 adag

A betegájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2013. december